



D. O. M.
 POSITIONES ANATOMICÆ
 ET
 CHIRURGICÆ.



EX ANATOMIA.



ENITALIUM viri fabricam quis non miretur! Si ex his sanis tot delicæ, tot bona profiliant; quot ex vitiatis dolores, quot morbi oriantur haud obscurum est. De Phimosi & Para-phimosi tantum acturi, solius Colis expositio Anatomica præmittenda videtur.

PENIS partes internæ & externæ: Hæ, cutis, cuticula, quibus Præputium & Frænulum conficiuntur; Membrana illis subjacet

cellularis nec non elastica, rigescenti colli admodum favens. Internas autem constituunt corpora cavernosa, glans, urethra, vasa, glandulae & musculi.

CORPORA duo cavernosa, externè Syndesmosa seu ligamentosa, internè verò spongiosa, disjunctim ossibus ischii adnata, versùs pubis symphysim, cui mediante Vesalii ligamento connectuntur, ad glandem usquè conjunctim protenduntur. Ab unione, transversis amborum fibris inter se intricatis, medium observatur septum instar cribri perforatum.

URETHRÆ canalis, vesicae collo contiguus, binis instruitur membranis; Inferiori corporum Cavernosorum sulco firmiter inherens, hiat in apice Balani; à Bulbo tantum Urethra, spongioso gaudens textu glandulis Cowperi Littriique referto, multis interiorius pertunditur foraminibus humorem stillantibus mucilaginosum.

GLANS sive Balanus, pars Colis extremà, exquisitissimo sensu donatus, epidermide tenui obtectus, cellulosa Urethrae parte confiat; humore sebaceo, ab interiori Præputii membranâ, superficies lubricatur.

ISCHIO-CAVERNOSI musculi, meritò ab Anatomicis Erectores, dum contrahuntur, venas utrinque premendo, sanguinis refluxui obstant; quo cruore, vasis turgentibus simul ac cellulis, intenditur Mentula. Huic actioni quodque famulantur Bulbo-Cavernosi musculi. Transversos verò eorum accessores tantum agnoscimus.

PENIS vasa pudenda, ut aiunt, externa & interna nuncupantur. Ab hypogastricis utraque; cutanea tamen à cruralibus procedunt: horum & illorum mutuam demiremur anastomosim; Genitalium hinc partium consensus intimus.

EX CHIRURGIA.

PRÆPUTIUM æquò brevius aut longius morbis non raro aniam præbet. Si arctius glandem cingat, Phimosis: si denudatam strangulet, Para-phimosis parit. Ad Chirurgum tunc citò confugere gravissimis symptomatibus tenentur ægroti.

NATURALIS & accidentalis improprie nuncupatur phimosis: hæc à causis plerumque externis natales habet; à pravâ conformatione producitur alia, ex se raro periculosa.

GLANDIS, aut Præputii phlogosis & intumescencia, materiam sebaceam corruptela, pruritus, dilacerationes, exulcerationes & calculi, has inter partes detenti, Phimosim benignam; malignam virus cancriforme aut venerea lues efficiunt.

Ex definitione innotescit Phimosi, ex causis autem & accidentibus diversa prognosis.

SI, venarum sectionibus, diætâ tenui præmissis, medicamenta superperdentur emollientia cum anodinis, nonnunquam removebitur Phimosi. Repercussoria, ut noxia prorsus rejicimus.

INGRAVESCENTIBUS accidentibus, medicamentis operatio tutior; quæ ut perficiatur, alia aliis, pro Phimoseos specie, anteponenda sunt instrumenta: si scalpro tamen locus sit, idoneum magis herniarium à D. Lapeyronio excogitatum censetur.

PARTIUM quandoque cohesio solitæ officit methodo: iteratæ tunc sectiones adhibendæ; ita ut tamen pars utraque non lædatur.

IN longiori Præputio, si angustius, quam ut scalpellus intro mittatur, celebranda circumcisio.

HÆMORRHAGIA, si quæ sit, deligato decenter vulnere, facile compescitur. Apparatus, ut moris est, fenestratus imponendus: Sursum colis laxè revinciatur. Virus demum & accidentia suis quæque amoveantur remediis.

QUOD majora sunt accidentia, eò majori arcenda celeritate: à symptomatibus pejor Phimosi Para-phimosi, quam nonnunquam inducere valet depressum ad radicem Balani Præputium, si incaute reducatur Phimosi.

HIC Phimoseos causæ & accidentia reposcenda: Cur verò stranguria, inflammatio ingens & sphacelus non raro, cum tardafalus requiritur, Paraphimosim concomitentur, ex morbi naturâ liquet.

4

LEVYS & recentis Para-phimoseos curatio iisdem ac Phimo-
seos remediis obtinenda : quandoque tamen succedit, si colis in fri-
gidam demittatur aquam.

HIS incassum adhibitis, ita adaugetur strangulatio ut, ni
protinus hinc & illinc omnes scalpro secentur habenæ, gangrenâ
mox corriperetur Mentula.

TUM in Phimosi tum in Para-phimosi, fanescente vulnere, ne
cutis Balano cohærescat, linamenta medicamentis imbuta inter-
ponenda.

*Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. LUDO-
VICO-ANTONIO RAVENET, Artium & Chirur-
giæ Magistro, tueri conabitur CAROLUS - TUSSANUS
VERMOND, Parisinus, Artium Liberalium Magister.*

P A R I S I I S,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

*Die Sabati 31^a. Julii à sesqui-secundâ post meridiem ad
septimam. Anno Domini 1751.*

P R O A C T U P U B L I C O,

Typis DELAGUETTE Regiæ Chirurg. Academiæ
Typographi 1751.